

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТРАНСФУЗИОЛОГОВ
www.transfusion.ru

07 января 2021 г.
№ 0712021/1

В Минздрав России
Логуновой Н.М.

Копия:
Гапоновой Т.В.
Вавиловой Т.В.
Эйхлер О.В.
Стефанюк Е.И.

Уважаемые коллеги!

Российская ассоциация трансфузиологов свидетельствует своё почтение и предлагает изменения во Временные методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, версия 9 (26.10.2020).

В качестве критериев отбора доноров антиковидной плазмы - использовать результаты зарегистрированных в России диагностикумов:

1) Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (spike) коронавируса SARS-CoV-2 «ГАМ-КОВИД-анти-RBD» (коэффициент позитивности не менее 3, Инструкция по применению набора, стр. 13),

2) Ortho VITROS SARS-CoV-2 IgG Test, коэффициент позитивности 12 и более (принят в США с 23.08.2020),

3) Abbott SARS-CoV-2 IgG II Quant, концентрация антител 4160 АЕ/мл и более (доложено на конгрессе Международного общества переливания крови 16.12.2020).

С уважением,

Председатель Совета РАТ
доктор медицинских наук, профессор



Е.Б. Жибурт